

# PRESTOP®

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grønsager, kryddeurter og pryddplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.

### FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Indeholder *Gliocladium catenulatum* stamme J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grønsager, kryddeurter og pryddplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### Førstehjælp

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Prestop WP

## Svampemiddel nr. 575-4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder *Gliocladium catenulatum* stamme J1446, 32 % w/w,  $10^7$ - $10^9$  CFU/g.

### Producent og registreringsindehaver:

Verdera Oy, PB 5, 02271 Esbo

### Forhandler:

**Indhold:** 100 g /1 kg

**Produktionsdato / Batch nr.:** Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen

**Holdbarhed:** Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen

# PRESTOP®

**Sporer og mycelium af svampen *Gliocladium catenulatum*.  $10^7$  –  $10^9$  cfu/g.**

**Anvendelsesområde:** Til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, *Fusarium* og gråskimmel (*Botrytis cinerea*) i grønsager, kryddeurter og pryddplanter (spiselige og ikke-spiselige kulturer), samt til bekæmpelse af Agurkesyge (*Didymella bryoniae*) i agurker.

**BRUGSANVISNING:** Prestop blandes med vand før brug. Prestop tilberedes således, at pulveret først kommer i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Opløsningen kan fordeles med sprøjte, ved vanding, via drypvanding eller ved blanding i voksemediet. I et drypvandingssystem tilsættes opløsningen via en blandingstank eller separat injektionspumpe. Bland ikke Prestop i en stærk næringsopløsning.

Blandingens koncentration	Blandingsforhold	
	Prestop-pulver	Vand
0,5%	100 g	20 liter
1%	100 g	10 liter

**Bekæmpelse af agurksyge på agurker og gråskimmel på tomater, paprika og agurker:** Stammen, især stambasen når det gælder sortplettet råd, sprøjtes med 0,5 % Prestop med fokus på sårstederne. Anvend ca 10 liter til 500 planter. Den første sprøjtning udføres straks efter udplantning eller senest efter, at der første gang er fjernet blade. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

**Bekæmpelse af gråskimmel på pryddplanter og småplanter af grønsager:** Anvend 0,5 % opløsning. Stiklinger behandles i stiklingsfasen, småplanter ved udplantningen. Behandlingen gentages efter behov med 3-4 ugers interval. Stiklinger kan også dyppes i 0,5 % opløsning før udplantning. Behandling af stiklinger anbefales kun til urteagtige vækster.

**Bekæmpelse af rodsygdomme:** Bedste tidspunkt for behandling er ved såning-, kultivering- og/eller udplantningstidspunktet. Behandlingen gentages med 3-4 ugers mellemrum.

**Anbefalede mængder:** I agurker, tomater, paprika og prydvækster anvendes 200-250 g Prestop/1000 planter. Ved blanding i vækstmediet anvendes der 200-500 g pulver/m<sup>3</sup>. For at være sikker på at præparatet fordeles jævnt, blandes Prestop i vækstmediet efter opløsning i vand. Stiklinger behandles med 5-10 g Prestop/m<sup>2</sup> i forbindelse med vandingen (vandmængden tilpasses vækstmediets vandindhold). Hvor der er tale om enkelte planter i plantebeholdere eller krukke, vædes vækstunderlaget med f.eks. 0,5 % Prestop. Mængden afhænger af krukken, beholderens eller rodklumpens størrelse jf. følgende tabel:

Pottestørrelse (vol)	Liter 0,5% Prestop pr. 1000 planter	Gram Prestop pr.1000 planter
100 ml	4-10	20-50
250 ml	10-25	50-125
500 ml	20-50	100-250
1 liter	40-100	200-500

**Bemærkninger:** Prestop anvendes i forebyggende øjemed. Præparatet er egnet til brug i integreret bekæmpelse. Du kan få mere information om kompatibilitet hos Verdera Oy. Præparatet er ikke skadeligt for bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblanding med andre vækstbeskyttelsesmidler eller koncentreret næringsopløsning.

**Begrænsninger i anvendelsen:** Må ikke bruges til stiklinger uden rødder. Må ikke bruges till stiklinger af træagtige vækster.

**Værnemidler:** Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril) samt hovedbeklædning. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 filter.

# PRESTOP®

**Holdbarhed:** Prestop er et biologisk produkt, som indeholder levende, tørrede svampesporer og mycelium. Produktet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage, når det opbevares tørt og køligt, under +8° C. Når emballagen er åbnet, bør indholdet straks bruges.

**Bortskaffelse:** Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.