

## ***Anagyrus fusciventris***

Parasitstekel mot långsvansade ullöss

*För kontroll av:* Ullusen *Pseudococcus longispinosus*. Den "långsvansade" ullusen. Endast äldre utvecklingsstadier parasiteras.

*Ordning:* Hymenoptera

*Familj:* Encyrtidae

*Ursprung:* Australien

*Utseende:* Honor gul-grå med ljusblå ögon. Basen på honans antenner är tydligt svällda. Hanar är svarta.



*Storlek:* 2-3 mm

*Utsättningsperiod:* April-September

*Dos:* 5-10 st/planta.

*Vid kraftigt angrepp:* Börja med *Cryptolaemus* larver.

*Allmänt:* Kontrollerar (parasiterar) endast vuxna stadier. Resultatet blir bäst vid tidiga eller små angrepp. Parasiteringen fungerar inte så bra på *Cycadaceae*.

*För kontroll och uppföljning:* Efter 3-4 veckor kan man se ullöss som "uppsvullna" gulaktiga kokonger, från vilken sedermera stekeln kläcker ifrån. Nya blad och skottspetsar skall vara fria från skadedjur. Parasiterade ullöss söker upp ett skyddat ställe för att förpupa sig (därför lite svåra att "följa" upp).

*Vid utsättning:* Temperatur över 20 °C. Räkna med minst 3 utsättningar.

*Andra supplerande produkter:*

*Cryptolaemus montrouzieri*- larver

*Chrysoperla carnea*

**Kontakta gärna oss för mer information**

Biobasiq Sverige AB • [info@biobasiq.se](mailto:info@biobasiq.se)

[www.biobasiq.se](http://www.biobasiq.se)